




УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!



ВПЧ может вызывать следующие заболевания:

1. Рак шейки матки
2. Рак анального канала
3. Рак влагалища
4. Рак ротовой полости и глотки
5. Рак полового члена
6. Аногенитальные кандиломы и папилломы

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее распространенной инфекцией, передаваемой половым путем

Рак является неизлечимым и быстро прогрессирующим заболеванием

Эффективной мерой профилактики признана вакцинация подростков до начала половой жизни в возрасте 9-13 лет!!!

Факторы риска развития ВПЧ:

1. Молодой возраст
2. Курение
3. Большое количество половых партнеров
4. Ранний возраст начала менструаций

Рекомендовано проведение иммунизации лицам женского и мужского пола в возрасте от 9 до 45 лет!!!

Стандартная схема вакцинации: **3 дозы (0-2-6 мес)**

Ускоренная схема вакцинации: **3 дозы (0-1-4 мес)**

Альтернативная двухдозовая схема вакцинации допускается для детей в возрасте 9-13 лет: **(0-6 мес)**

В случае введения второй дозы ранее, чем через 6 мес после первой, необходимо выполнить третью дозу

