

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАЛГЕЛЬ® / CALGEL®

Гель стоматологический, 3,3 мг + 1,0 мг в 1 г

«ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.», Польша

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ___ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none">• Гиперчувствительность к лидокаину, другим амидным анестетикам, цетилпиридинию или любому другому компоненту препарата;• редкая наследственная непереносимость фруктозы;• детский возраст до 3-х месяцев.	<p>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none">• Гиперчувствительность к лидокаину, другим амидным анестетикам, цетилпиридинию или любому другому компоненту препарата;• редкая наследственная непереносимость фруктозы;• детский возраст до 5-ти месяцев.

Менеджер отдела
регуляторных отношений
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Старкова Н.С.