

## Противопоказания к вакцинации

Причины для полного запрета к введению профилактических прививок в реальной жизни **встречаются крайне редко.**

Среди них:

- выраженные аллергические реакции на компоненты, входящие в состав вакцины (антибиотик, дрожжи, куриное или перепелиное яйцо) в виде анафилактического шока, крапивницы, отека Квинке;
- тяжелые формы иммунодефицита, подтвержденного лабораторными данными, являются противопоказанием только для использования живых вакцин;
- сильная реакция на введение предыдущей дозы конкретной вакцины: а) краснота и отек в месте введения более 8 см в диаметре б) лихорадка выше 40<sup>0</sup>С: в первые 3-е суток после вакцинации инактивированной (убитой) вакциной, на 5-21 сут – живой ослабленной прививки (против кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы) в) синдром длительного непрекращающегося плача и крика (более 3 часов)

На период течения острого заболевания или обострения хронического заболевания вакцинация только лишь откладывается на время, причём в редких случаях - на срок более месяца.

Прививки можно проводить сразу после нормализации температуры тела или прекращения диареи при легком течении острой инфекции. А в случае угрозы тяжелой вирусной инфекции, например, при контакте с больным корью или ветряной оспой, вакцинация проводится в экстренном порядке даже при остаточных или незначительных проявлениях сопутствующей болезни на фоне необходимой температуры.

**Помните**, что врач в рекомендациях должен указать срок временного отвода от вакцинации. И в преобладающем большинстве случаев, этот промежуток составляет от 1 нед до 1 мес. Для более длительного отлагательства вакцинации должны быть серьезная причина болезни с тяжелыми клиническими проявлениями!